



## 予防接種

問合せ 健康増進課予防係(ふれあいセンター)  
TEL.50-1173

● 予防接種一覧(乳幼児期) ※詳しくは、「予防接種の受け方について」(生後2か月頃送付)をご覧ください。

予防接種名	対象年齢	接種回数(間隔)
ヒブ Hib感染症	生後2か月～5歳未満 標準接種期間 = 初回:生後2か月～生後7か月	初回:3回 (27日以上間隔をおいて3回接種)  追加:1回 (初回3回目終了後、7か月以上間隔をおいて接種)
小児の 肺炎球菌 感染症	生後2か月～5歳未満 標準接種期間 = 初回:生後2か月～生後7か月 追加:生後12か月～生後15か月	初回:3回 (27日以上間隔をおいて3回接種)  追加:1回 (初回3回目終了後、60日以上間隔をおいて1歳以降接種)
B型肝炎	1歳未満 標準接種期間 = 生後2か月～生後9か月	3回 (27日以上間隔をおいて2回接種した後、 1回目接種後139日以上の間隔をおいて3回目を接種)
四種混合	生後3か月～7歳6か月未満 標準接種期間 = 初回:生後3か月～1歳	初回:3回 (20日以上間隔をおいて3回接種)  追加:1回 (初回3回目終了後、6か月以上間隔をおいて接種)
BCG	1歳未満 標準接種期間 = 生後5か月～生後8か月	1回
麻しん 風しん混合	1期:1歳～2歳未満  2期:5歳～7歳未満で小学校就学前年の1年間 (幼稚園・保育園の年長児)	1期:1回  2期:1回
水痘	1歳～3歳未満 標準接種期間 = 1回目:1歳～1歳3か月	2回 (1回目終了後、3か月以上間隔をおいて接種)
日本脳炎	1期:生後6か月～7歳6か月未満 標準接種期間 = 初回:3歳～4歳/追加:4歳～5歳	1期初回:2回 (6日以上間隔をおいて2回接種)  1期追加:1回 (1期初回2回目終了後、6か月以上間隔をおいて接種)

※異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

BCG、麻しん風しん、水痘(生ワクチン)は27日以上あける。他のワクチン(不活化ワクチン)は6日以上あける。